

Kdy má být dítě vyšetřeno lékařem?

Celkové příznaky: neklid, pláč, odmítání potravy, obtížná chůze, časté močení nebo náhle vzniklé pomočení, teplota, zvracení, bolesti břicha-podbřišku,

údaj bolesti ve skrotu

Nález na šourku: otok, zarudnutí kůže, bolestivost spontánní či při pohmatu.

Co je nutné provést?

Zvláště u kojenců a batolat, při náhlé změně chování a dalších celkových příznacích, musí rodič vždy vyšetřit šourek, a to pohledem i pohmatem. Při nálezu, který se liší od dříve pozorovaného normálního nálezu, okamžitě navštívit lékaře. Aby se zabránilo časové prodlevě, je vhodné navštívit přímo chirurga či urologa. Je nutné, aby dítě bezprostředně před návštěvou lékaře nejedlo a nepilo. Při podezření na otočení spermatického provazce nebo při uskřinuté kýle je nezbytná akutní operace a požití jídla může její provedení oddálit.

Jaká vyšetření dítě čekají?

Vyšetření moče a v některých případech i krve, vyšetření břicha, penisu a šourku pohledem a pohmatem.

Ultrazvukové vyšetření ledvin, močového měchýře a šourku, na některých pracovištích provedení izotopového vyšetření skrota či nukleární magnetické rezonance skrota.

Velmi často je nutno při příznacích akutního skrota provést operační revizi příslušné poloviny šourku.

Akutní onemocnění skrota u dětí

Akutní onemocnění šourku jsou charakterizována náhle vzniklým zvětšením, bolestivostí a případně i zarudnutím poloviny nebo celého skrota.

Příčin, který tento stav vyvolávají je více. Akutní postižení šourku může být projevem zánětlivého onemocnění, úrazu, může dojít k uskřinutí kýly, k otočení semenného provazce nebo se může jednat i o místní projev celkového onemocnění. Jsou ještě další příčiny, které vyvolávají obraz akutního šourku, neohrožují dítě ani osud varlete, ale jejich odlišení od výše uvedených příčin není jednoduché.

Příznaky jednotlivých onemocnění nemusí být typické a nemusí jednoznačně ukazovat na postižení skrota. Liší se nejen podle vyvolávajících příčin, ale také podle věku.

Rodiče si musí být vědomi toho, že přehlédnutí či zanedbání péče o dítě s příznaky akutního šourku může způsobit ztrátu varlete nebo i vážné ohrožení zdravotního stavu dítěte. Je proto nutné, aby dítě s podezřením na náhle vzniklé onemocnění šourku, bylo vždy co nejdříve vyšetřeno lékařem a byla zahájena odpovídající léčba.

*MUDr. Oldřich Šmakal
Urologická klinika, FN Olomouc*

STRANA PRO PACIENTY