

Vážení čtenáři, na stránkách Urologie pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Hypergonadotropní hypogonadismus muže svědčí pro:

- a) výpadek funkce hypotalamu
- b) poruchu sekrece testosteronu na úrovni varlat
- c) výpadek funkce hypofýzy
- d) Klinefelterův syndrom

2 Absolutní kontraindikací léčby PADAM je:

- a) pokles celkového testosteronu k (pod) dolní fyziologické hranici
- b) karcinom prostaty
- c) hyperplazie prostaty
- d) zvýšení potence

3 Ke každodennímu užívání malé dávky terapeutické látky při léčbě ED se nejlépe hodí z hlediska farmakodynamického:

- a) sildenafil
- b) vardenafil
- c) tadalafil
- d) alprostadil

4 K diagnotice feochromocytomu používáme:

- a) plazmatické nebo močové metanefriny
- b) volný močový kortizol
- c) plazmatický aldosteron
- d) plazmatickou reninovou aktivitu

5 V předoperační přípravě feochromocytomu používáme:

- a) anxiolytika při záchvatech
- b) alfablokátory
- c) pouze betablokátory
- d) antidepresiva jako prevenci záchvatu

6 Obvyklá délka antibiotické léčby v případě asymptomatické bakteriurie v těhotenství je:

- a) 24 hodin
- b) 3 dny
- c) 5–7 dní
- d) 10–14 dní

7 Incidence akutní pyelonefritidy v těhotenství je:

- a) 20 %
- b) 1–4 %
- c) 0,5 %
- d) 37 %

8 Léčba chlamydiové infekce v těhotenství:

- a) není nutná
- b) je možná kterýmkoliv antibiotikem vhodným v těhotenství
- c) má trvat 7–10 dní
- d) je nejvhodněji provedena 1 g azitromycinu formou jednorázového podání

9 V prevenci recidivujících infekcí močových cest mohou být účinnými:

- a) extrakty brusinek
- b) doplňky stravy obsahující D-manózu
- c) bakteriální extrakt OM-89 (Uro-Vaxom) v případě infekcí způsobených *Escherichia coli* či imunomodulační přípravek Urivac v případě infekcí vyvolaných *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pn.*, *Enterococcus faecalis*, *Proteus mirabilis*, *E. coli*
- d) dlouhodobé užívání malých profylaktických dávek antibiotik či chemoterapeutik

10 Dlouhodobé profylaktické používání malých dávek antibiotik či chemoterapeutik (například na noc, po pohlavním styku) může:

- a) snížit počet recidiv infekcí močových cest
- b) být spojeno se zlepšením jaterních testů
- c) být spojeno se vznikem rezistentních kmenů bakterií, zejména v případě užívání antibiotik s negativním epidemiologickým vlivem (například chinolony)
- d) probíhat zároveň s užíváním přírodních doplňků stravy obsahujících D-manózu, extrakty brusinek či s imunomodulačními preparáty, jako jsou bakteriální lyzáty (například Uro-Vaxom, Urivac)

11 Prostate cancer gene 3 (PCA3) je:

- a) bílkovina
- b) mukopolysacharid
- c) ribonukleová kyselina
- d) deoxyribonukleová kyselina

12 PCA3 se nejvíce exprimuje:

- a) v normálních buňkách prostaty
- b) v buňkách benigní hyperplazie prostaty
- c) v buňkách karcinomu prostaty
- d) v semenných váčcích

Správné odpovědi: 1. b, d; 2. b, c; 3. c; 4. a; 5. b; 6. c; 7. b; 8. d; 9. a, b, c, d; 10. a, c, d; 11. d; 12. c