

Vážení čtenáři, na stránkách Urologie pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Jaká je hlavní funkce močového měchýře?

- a) jímací
- b) vyprazdňovací
- c) obě výše uvedené
- d) ani jedna uvedená

2 Jak klasifikace ICS rozděluje poruchy podle jejich vlivu:

- a) jen na detruzor
- b) na detruzor a svěrač
- c) jen na svěrač
- d) na pánevní dno

3 Mezi operační léčbu u hypoaktivního svěrače nepatří:

- a) slingové procedury
- b) přerušení inervace močového měchýře
- c) parauretrální aplikace terapeutik
- d) augmentační cystoplastika

4 Mezi kvartérní aminy nepatří toto anticholinergikum:

- a) tolterodin
- b) oxybutynin
- c) trospium
- d) darifenacin

5 Dráždivý měchýř se projevuje:

- a) urgencemi k mikci
- b) stranguriemi
- c) hematurií
- d) inkontinencí

6 Mezi často užívané byliny v léčbě infekcí močových cest patří:

- a) přeslička rolní
- b) divizna velkokvětá
- c) lichořejšnice větší
- d) ostropestřec mariánský

7 Při léčbě infekcí dolních močových cest potlačuje fyziologickou vaginální flóru:

- a) norfloxacin
- b) nifuratel
- c) amoxicilin
- d) cotrimoxazol

8 Který z fluorochinolonů, jenž byl nově uveden v České republice, lze podat v léčbě infekcí močových cest jednorázově v dávce 600 mg?

- a) ofloxacin
- b) pefloxacin
- c) prulifloxacin
- d) norfloxacin

9 Který z níže uvedených preparátů při léčbě infekcí močových cest lze užívat během gravidity od 2. trimestru a při kojení?

- a) norfloxacin
- b) cotrimoxazol
- c) ciprofloxacin
- d) nifuratel

10 Mezi typy UZ vyšetření patří:

- a) B-mod
- b) Dopplerovské zobrazení
- c) harmonické zobrazení
- d) C-mod

11 Postkontrastní UZ vyšetření lze provádět:

- a) na jakémkoliv UZ přístroji
- b) po intraarteriálním podání kontrastní látky
- c) v barevném modu
- d) u pacientů s renálním selháním

12 UZ vyšetření umožňuje:

- a) bezpečnou diferenciaci jednotlivých renálních tumorů
- b) kvalitnější zobrazení u obézních pacientů
- c) posoudit perfuzi ledvin
- d) sledovat efekt radiofrekvenční ablace tumorů ledvin

Správné odpovědi: 1. c; 2. b, d; 3. b; 4. a, b, d; 5. a, d; 6. a, c; 7. c; 8. c; 9. d; 10. a, b, c; 11. d; 12. c, d