

Vážení čtenáři, na stránkách Urologie pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Nykturie je dle standardizace terminologie ICS z roku 2002 definována jako

- a) jakékoliv močení v noci
- b) minimálně jedno probuzení v noci za účelem močení
- c) minimálně dvě probuzení v noci za účelem močení
- d) 3 a více probuzení v noci za účelem močení

2 Noční polyurie

- a) je produkce abnormálního množství moči během spánku, nad 20 % celkového denního objemu u mladých jedinců a nad 33 % ve vyšším věku
- b) je méně častá u starých lidí
- c) příčinou je obrácení cirkadiálního rytmu produkce moči ovlivněné sekrecí antidiuretického hormonu
- d) její nejčastější příčinou je nadměrný příjem tekutin

3 Léčba desmopresinem

- a) je kontraindikovaná u pacientů nad 65 let
- b) byla ověřena celou řadou studií a její relativní bezpečnost se prokázala i u pacientů nad 65 let
- c) je nutné kontrolovat natrémii před a brzy po zahájení léčby
- d) je indikována pouze u pacientů s diabetes insipidus a enuresis nocturna

4 Plexus pampiniformis je česky:

- a) bobulovitá pleteň
- b) hrozníčkovitý plexus
- c) úponkovitá pleteň
- d) révovitý stonek

5 Diagnostika varikokély je optimální v kombinaci metod:

- a) klinické vyšetření, ultrasonografie, venografie
- b) klinické vyšetření, termografie (termometrie), Dopplerovská ultrasonografie
- c) ultrasonografie, venografie
- d) termografie, Dopplerovské vyšetření, venografie

6 Léčba varikokély je indikována:

- a) při orchialgii
- b) při infertilitě muže
- c) při poruše testikulárních funkcí
- d) při klinickém nálezů varikokély 3. stupně

7 Při patologickém spermiogramu je indikován postup:

- a) podávání doplňků stravy, které mají zlepšit spermiogenezi
- b) asistovaná reprodukce
- c) druhé vyšetření spermiogramu a v případě opakovaného nálezů andrologické vyšetření muže
- d) doporučení dárcovství spermatu

8 Mezi nejčastější multicystické nádory ledviny patří:

- a) multilokulární multicystický renální karcinom
- b) chromofobocelulární renální karcinom
- c) medulární renální karcinom
- d) renomedulární intersticiální tumor

9 U následujících nádorů je známá maligní varianta:

- a) angiomyolipom
- b) renomedulární intersticiální tumor
- c) smíšený epiteliální a stromální tumor ledviny
- d) ossifikující renální tumor dětského věku

10 U následujících nádorů je možné předoperačně pomocí zobrazovacích metodik obvykle stanovit diagnózu:

- a) angiomyolipom
- b) multilokulární světlobuněčný multicystický renální karcinom
- c) smíšený epiteliální a stromální tumor ledviny
- d) renální onkocytom

11 Nejdůležitějším rizikovým faktorem pro vznik inkontinence po radikální prostatektomii je:

- a) věk pacienta
- b) striktura vezikouretrální anastomózy
- c) nestabilita detruzoru
- d) velikost prostaty

12 Časná inkontinence moče po radikální prostatektomii je spojena:

- a) s předchozí transuretrální resekci prostaty
- b) s velikostí prostaty
- c) s nestabilitou detruzoru
- d) s komorbiditami

Správné odpovědi: 1. b; 2. a, c; 3. b, c; 4. c; 5. b; 6. a, b, c, d; 7. c; 8. a; 9. a, c; 10. a; 11. b; 12. c