

Vážení čtenáři, na stránkách Urologie pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Inhibitory fosfodiseterázy typu 5 zlepšují:

- a) sexuální apetenci
- b) erektilní dysfunkci
- c) pohyblivost a počet spermií
- d) plicní hypertenzi

2 Kolik procent pacientů s OAB (hyperaktivním močovým měchýřem) má výrazné potíže s kontinencí?

- a) 10 %
- b) 20 %
- c) 33 %
- d) 41 %

3 Mezi historicky starší alfa1-antagonisty (alfa adrenergní antagonisty) nepatří:

- a) doxazosin
- b) tamsulosin
- c) terazosin
- d) alfuzosin

4 Mezi nejčastější vedlejší negativní účinek antimuskarinik patří:

- a) retrográdní ejakulace
- b) retence moče
- c) pocit sucha v ústech
- d) zácpa

5 Hormonálně aktivní karcinom kůry nadledvin se může projevit:

- a) hyperaldosteronismem
- b) hyperkortikalizmem
- c) hyperandrogenismem
- d) všemi těmito projevy

6 Histologicky mohou diferencované karcinomy kůry nadledvin:

- a) hromadit v cytoplazmě lipidy
- b) mít pouze trabekulární strukturu
- c) buněčné atypie mohou zcela chybět nebo mohou být přítomny ložiskovitě
- d) často se v nich nachází i ložiska nekrózy a hemoragie

7 Které z následujících tvrzení o nádorovém trombu u RCC je pravdivé:

- a) v době stanovení diagnózy je přítomen u 10–15 % pacientů
- b) častější je postižení levostranné
- c) intravenózní propagace nádoru je špatnou prognostickou známkou
- d) nádorový trombus je vždy známkou generalizace RCC

8 K přesné diagnostice nádorového trombu slouží:

- a) sonografické vyšetření břicha
- b) Dopplerovské vyšetření renálních vén
- c) CT vyšetření břicha s kontrastní látkou
- d) MRI

9 Jak je definována inkontinence moče dle ICS?

- a) stav, kdy jedinec není schopen sám a vědomě regulovat odchod moči močovou trubicí a dochází k nedobrovolnému úniku moči
- b) jakýkoliv nedobrovolný únik moče
- c) jakýkoliv únik moči
- d) jakýkoliv nedobrovolný únik moči a stolice

10 Co je sipping?

- a) pomalé podávání infuzního roztoku
- b) popíjení, usrkávání nápojů určených pro výživu
- c) kontinuální podávání enterální výživy do sondy
- d) pomalé polykání mixované stravy

11 Kdy je kontraindikována enterální výživa?

- a) při komatózních stavech bez zajištění dýchacích cest
- b) při náhlé příhodě břišní
- c) při mucozitidě v dutině ústní
- d) při mechanickém ileu

12 Mezi biochemické markery výživy nepatří:

- a) prealbumin
- b) transferin
- c) cholinesteráza
- d) alfa-fetoprotein

Správné odpovědi: 1. b, c; 2. c; 3. b, d; 4. c, d; 5. d; 6. a, b, c; 7. a; 8. b, d; 9. b; 10. b; 11. a, b, d; 12. d