

Informace pro pacienty o intrakavernózní aplikaci

Milý čtenáři, vážený paciente,

tento informační leták slouží k upevnění Vašich znalostí o aplikaci přípravku Karon®.

K čemu slouží lék Karon®?

Karon® je určen k léčbě poruch erekce. Používá se zejména při selhání léčby tabletami. Aplikuje se pomocí injekční stříkačky s jehlou do topořivého tělesa penisu.

Jaké množství si mohu aplikovat a jak často?

Dávka se určí po dohodě s lékařem dle efektu. Aplikace by se neměla provádět častěji než ob den a je vhodné střídat strany vpichu.

Kde mám mít lék?

Lahvičku s lékem uchovávejte v lednici.

Aplikace léku Karon® krok po kroku

(Zaučení aplikace provádí lékař.)

- Nejprve si připravte lahvičku s lékem, dezinfekci a injekční stříkačku s jehlou. Dezinfekci nastříkejte na gumový uzávěr lahvičky. Zasuňte jehlu stříkačky do lahvičky a obraťte ji dnem vzhůru. Pomalým pohybem natáhněte požadovaný objem léku a vytáhněte jehlu z lahvičky. Opatrně nasadte kryt na jehlu.
- Aplikace se nejlépe provádí vsedě za dostatečného osvětlení. Postříkejte předpokládané místo vpichu dezinfekcí. Uchopte injekční stříkačku jako šipku. Druhou rukou uchopte penis za žalud, natáhněte jej dopředu a nakloňte jej směrem ke stehnu. Vhodné místo vpichu je asi 4 cm od konce penisu na jeho boční straně. Vyhněte se, prosím, viditelným cévám. Rychlým pohybem zaveďte takřka celou jehlu do penisu. Aplikujte lék.
- Po ukončení aplikace nasadte na jehlu kryt a i se stříkačkou je dejte do odpadu. Jestli místo vpichu krvácí, stlačte jej tamponem.
- Při neúspěšném podání, kdy se nedostaví dostatečné ztopoření penisu, aplikaci již týž den neopakujte.


Kdy mám navštívit svého lékaře?

Při vzniku komplikací, jako je neustávající krvácení z místa vpichu nebo zarudnutí a teploty, kontaktujte, prosím, lékaře.

V případě trvání erekce déle než tři hodiny je nutné urychleně vyhledat urologické pracoviště!

Budeme rádi, pokud Vám informační leták pomůže úspěšně zvládat intrakavernózní aplikaci.

Obrázek. A. CAT – místa vpichu;
B. CAT – hloubka vpichu



Obrázky převzaty se souhlasem
doc. MUDr. Vladimíra Študenta, Ph.D.

Mgr. Pavla Kordulová,
MUDr. Lukáš Bittner, FEBU
Urologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50, 100 34 Praha