

## Typy a aplikace terapeutických materiálů

### Roztoky

Roztoky řadíme mezi standardní součást ošetření a léčby všech typů ran. Pro dekontaminaci spodiny rány je doporučována aplikace roztoku ve formě obkladu, tj. s kombinací gázy v tenké vrstvě (1 kus gázového krytí), dobře nasycené příslušným typem roztoku. Důležitá je expoziční doba ponechání roztoku na spodině rány, která se průměrně pohybuje kolem 15–20 minut. Při opakované aplikaci roztoků odpařováním tekutiny dochází k vysoušení rány. V současné době obchodní trh nabízí 17 druhů roztoků, které lze rozdělit do několika skupin (superoxidované, se singletovým kyslíkem, antiseptické) (Obr. 1.).

### Pasty

Pasty se vyznačují různou konzistencí. Aplikují se v tenké vrstvě a v lokalitě genitálií mají výhodu opakovaného použití bez nutnosti savého nebo fixačního krytí (Obr. 2.).

### Spreje s obsahem stříbra

Mají výhodu rychlé aplikace bez nutnosti sekundárního krytí nebo fixace. Jednotlivé prostředky se od sebe rozlišují typem vehikula (škrob, kaolin aj.). Antiseptický účinek zajišťují molekuly stříbra (Obr. 2.).

Roztoky, pasty a spreje doporučují používat denně v době vývoje rány až do fáze čištění, kdy dochází k ohraničení (demarkaci) rány.

### Filmy

Mezi poškození v oblasti genitálií a na genitáliích je možné zařadit i iritační dermatitis. Je častou komplikací při inkontinenci moče, průjmovitých stolicích nebo zapáříkách.

**Obr. 1.** Použití roztoku k vysoušení poškození v kombinaci s neadherentním krytím



**Obr. 2.** Použití pasty nebo spreje k vysoušení poškození



**Obr. 3.** Použití Cavilon Advanced u iritační dermatitis



**Obr. 4.** Použití hydrogelu k autolytickému debridementu



**Obr. 5.** Použití enzymatické masti nebo krému s kyselinou hyaluronovou



Lokální terapie se koncentruje na prostředky s obsahem ichtyolu nebo na krémy s kortikoidy. Cavilon advanced je bariérový roztok v aplikátoru nanášený na očištěnou pokožku na lokalitu s možností iritace exkrety. Má profylaktický i léčebný účinek. Po aplikaci transparentní film zajišťuje ochranu a léčbu po dobu 5–7 dnů (Obr. 3.).

### Hydrogely

Hydrogely působí rehydrataci tkáně (k odloučení devitalizovaných tkání nebo k podpoře proliferace) ve všech fázích vývoje rány. Obchodní trh v České republice nabízí více než 20 druhů hydrogelů různých konzi-

# Vše pro suchou kůži

PROKÁZANÁ ÚČINNOST  
PŘI LÉČBĚ XERÓZY  
redukce xerózy

80 %

po 8 týdnech používání\*

BEZ  
PARABENŮ  
A  
PARFUMACE

www.suchakuze.cz

# DEXERYL®

DERMATOLOGICAL EXPERTISE

Jedinečné složení, které hydratuje  
a obnovuje kožní bariéru.  
Pro suchou i atopickou kůži.

Dexeryl® zvláčňující krém je zdravotnický prostředek. Seznamte se s návodem k použití a s informacemi o bezpečném užívání prostředku. Certifikát vydala notifikovaná osoba číslo 0459

\*Boralevi F. et al. Regression of cutaneous xerosis with emollient treatment in sub-Saharan African patients. Int. J. Dermatol. 2017; 56(4): 467-473.

SERVIS 24H/7D:  
+ 420286004111, info.cz@pierre-fabre.com  
Pierre Fabre Derma-Cosmetique Tchequie,s.r.o., Kolbenova 1021/9, 190 00 Praha 9, Česká republika

MADE IN FRANCE



Pierre Fabre