

SDĚLENÍ Z PRAXE

174 MUDr. Marek Jurok, MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MBA, MUDr. František Chmelík, FEBU, MUDr. Petr Hrabal
Renomedulární tumor z intersticiálních buněk – nález neobvyklé velikosti

177 MUDr. Ondřej Cempírek, MUDr. Tomáš Málek, MUDr. Roman Boháč
Metastazující/multicentrický renální epiteloidní angiomyolipom – klinická kazuistika

KOMENTÁŘE

180 MUDr. David Čapka
Kardiovaskulární bezpečnost substituční terapie testosteronem: komentář ke studii TRAVERSE

PRO SESTRY

185 Mgr. Bc. Hana Novotná
Informovaný pacient se lépe uzdravuje

Sokar

8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
 fesoterodin-fumarát



účinná látka
fesoterodin-fumarát

léková forma
 tableta s prodlouženým uvolňováním

ATC G04BD11

28x 8mg kód SÚKL 0267400

Zabcare 5mg
10mg

potahované tablety
 Solifenacin succinas



účinná látka
solifenacin succinas

léková forma
 potahované tablety

ATC G04BD08

90x 5mg kód SÚKL 0265491
 90x 10mg kód SÚKL 0265493



NÁZEV PŘÍPRAVKU:

Zabcare 5 mg potahované tablety, Zabcare 10 mg potahované tablety

INDIKACE: Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a naléhavosti močení u dospělých pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem.

DÁVKOVÁNÍ: Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu 1x denně. Dávku lze zvýšit na 10 mg solifenacin sukcinátu 1x denně.

NÁZEV PŘÍPRAVKU:

Sokar 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

INDIKACE: K léčbě dospělých se symptomy (zvýšená frekvence močení a/nebo urgence močení a/nebo urgentní inkontinence), které se mohou vyskytnout u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

DÁVKOVÁNÍ: U dospělých je doporučena počáteční dávka 4 mg 1x denně. Dávku lze zvýšit na 8 mg 1x denně. Maximální dávka je 8 mg 1x denně.