

Spasmed[®]

tropii chloridum

* LÉK
1. VOLBY

ÚČINNÁ A BEZPEČNÁ LÉČBA HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE



* Dle podmínek úhrady SÚKL je Spasmed[®] lékem 1. volby v léčbě hyperaktivního močového měchýře.¹

Literatura:

1. Matoušková M. Preskripční omezení urologických a uroonkologických léčivých přípravků, platné k 1. 8. 2015. Urol. praxi 2015; 16(4): 182–186.

Zkrácené informace o léčivém přípravku: Spasmed 15 mg potahované tablety, Spasmed 30 mg potahované tablety; **Složení:** Trospii chloridum 15 mg nebo 30 mg v 1 potahované tabletě. **Indikace:** Symptomatická léčba zvýšené frekvence močení a/nebo urgencye močení a/nebo urgentní inkontinence u dospělých a dětí od 12 let se syndromem hyperaktivního močového měchýře nebo s urodynamicky ověřenou idiopatickou nebo neurogenní hyperaktivitou detruzoru. **Kontraindikace:** hypersenzitivita na léčivou látku, retence moči, glaukom s úzkým úhlem, tachyarytmie, myasthenia gravis, závažné chronické zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitida nebo Crohnova nemoc), toxický megakolon, poškození ledvin vyžadující dialýzu. Přípravek není určen k léčbě dětí do 12 let. **Nežádoucí účinky:** Nejčastěji se může objevit sucho v ústech, dyspepsie, zácpa, bolest žaludku a nauzea. **Interakce:** Přípravek může zesilovat anticholinergní účinek amantadinu, tricyklických antidepresiv, chinidinu, antihistaminik a disopyramidu, může potencovat tachykardizující účinek betasympatomimetik a snížit účinek prokinetik (např. metoklopramid a cisaprid). Guar, cholestyramin a cholestipol mohou snížit absorpci trospii chloridu. **Upozornění:** Vzhledem k poruchám akomodace může být narušena schopnost řídit a obsluhovat stroje. Zvláštní opatření je třeba u pacientů s obstrukcí gastrointestinálního traktu, obstrukcí močového průtoku s rizikem vzniku retence moči, autonomní neuropatií, hiátovou hernií a refluxní ezofagitidou, těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin a u pacientů, kde je nevhodná rychlá srdeční frekvence (hypertyreóza, ICHS, srdeční nedostatečnost). Před zahájením léčby je nutné vyloučit organické příčiny polakisurie a urgencye (choroby srdce nebo ledvin, polydipsie, záněty a nádory močových cest). Během gravidity a laktace podáváme přípravek jen tehdy, je-li to nezbytně nutné. **Dávkování a způsob podání:** Doporučená denní dávka je 45 mg trospii chloridu. Po zvážení individuální účinnosti a snášenlivosti může být denní dávka snížena na 30 mg nebo zvýšena na 90 mg po 4 týdnech léčby. U pacientů se středně těžkým a těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu 15–59 ml/min/1,73 m²) je doporučená denní dávka 1 × denně 15 mg trospii chloridu. Potahované tablety nebo jejich poloviny se polykají nerozkousané, nalačno a zapíjejí se sklenicí vody. Nutnost pokračování léčby musí být přehodnocována v pravidelných intervalech každých 3–6 měsíců. **Zvláštní opatření pro uchování:** Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování. **Balení:** 30, 50 a 100 potahovaných tablet po 15 mg, 30 a 50 potahovaných tablet po 30 mg. **Datum revize textu:** 28. 2. 2019. S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. **Držitel rozhodnutí o registraci:** PRO.MED.CS Praha a. s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika.

0111112976